Un **traitement antirétroviral post-exposition** vous a été prescrit par votre médecin.

Ce traitement doit être **débuté le plus tôt possible** (au maximum dans les 48h suivant l'exposition).

Le **médecin référent** que vous rencontrerez dans les jours à venir évaluera tous les **facteurs de risque** et pourra juger nécessaire la poursuite du traitement pendant **4 semaines sans interruption.**

Pour obtenir des conseils pharmaceutiques sur les médicaments qui vous ont été remis, vous pouvez appeler l'UPHARMA à l'Hôtel-Dieu au :

01.42.34.79.02
htd-upharma@aphp.fr



brochure mise à jour le 13/09/2021

TRAITEMENT EN CAS D'ACCIDENT D'EXPOSITION AVEC RISQUE DE CONTAMINATION (TPE)



EFFETS INDÉSIRABLES

Le traitement associant **Emtricitabine + Ténofovir disoproxil + Darunavir + Ritonavir** est généralement bien toléré.

Les **effets indésirables les plus fréquents** sont des troubles digestifs (diarrhées, douleurs abdominales, nausées).

D'autres effets indésirables ont été rapportés : maux de tête, éruptions cutanées, troubles rénaux (chez les patients ayant un **trouble rénal pré-existant**).

La **surveillance du traitement** est assurée par un bilan biologique à 15 jours.

CONTRE-INDICATIONS

Contre-indications de terrain :
Allergie Emtricitabine + Ténofovir disoproxil, Darunavir ou Ritonavir, insuffisance hépatique, trouble rénal sévère.

Médicaments contre-indiqués :
Amiodarone, Alfuzosine, Rifampicine (Rifadine®), Simvastatine, Clozapine, Quétiapine (Xeroquel®), Pimozide (Orap®), préparations à base de plantes contenant du millepertuis, dérivés de l'ergot de seigle (par ex. l'ergotamine et la dihydroergotamine contenues notamment dans Gynergène-caféine®, Séglor®...), Ticagrelor (Brilique®), Clorazépate (Tranxène®), Diazepam (Valium®), Sildenafil (Revatio®).

Si vous prenez d'autres médicaments ou de la phytothérapie (plantes, millepertuis, ...), communiquez leur nom à votre médecin car leur action peut interférer avec les médicaments contenus dans ce kit et affecter son efficacité.

MÉDICAMENTS ET POSOLOGIES

Les 3 comprimés sont à prendre ensemble en **une prise par jour à heure fixe au cours d'un repas ou d'une collation**. Les comprimés sont à avaler **entier avec un verre d'eau.**
La **prise régulière** selon ce schéma des trois médicaments est un facteur de réussite du traitement.



en 1 prise unique par jour

CONSEILS

- Utiliser des **préservatifs** à chaque rapport sexuel.
- L'efficacité des **contraceptifs oraux** (pilule) est diminuée par la prise de ce traitement.
- **En cas d'oubli d'une prise** : prendre les comprimés oubliés dès que possible, puis prendre la prise suivante à l'horaire habituel (respecter un intervalle minimum de 12h entre les 2 prises).
- **En cas de vomissements** : reprendre une prise uniquement si le vomissement a eu lieu dans la ½ heure qui a suivi la prise des médicaments.
- **Tout traitement interrompu ou inutilisé doit être rapporté à la Pharmacie.**