

La patiente a-t-elle pris un AINS < 4 heures avant son passage au SAU ?

Non

Oui

Il existe une contre-indication aux AINS ?

Administrer **successivement** (**!!\NE PAS MELANGER**) :

- 1 poche de 100mL de NaCl 0,9% **sur 30min** contenant **1 ampoule de TRANXENE® IV 20mg/2ml** (Clorzébate)*
prédiluée avec le solvant fourni
- 1 poche de NaCl 0,9% de 100mL **sur 20min** contenant **1 ampoule PROFENID® 100mg/2mL** (Kétoprofène)
- 1 poche **sur 15min** de **PARACETAMOL 1000mg/100mL**

* Si non disponible : 1 ampoule VALIUM® 10mg/2mL (Diazépam)

Réévaluer douleur 4 heures après

Si non efficace :

- 1 ampoule de **SPASFON IV 40mg/4mL** en IVD
- 1 poche de NaCl 0,9% de 100mL **sur 20min** contenant **1 ampoule de NEFOPAM IV 20mg/2mL**

Administrer **successivement** (**!!\NE PAS MELANGER**) :

- 1 ampoule de **SPASFON IV 40mg/4mL** en IVD
- 1 poche de 100mL de NaCl 0,9% **sur 30min** contenant **1 ampoule de TRANXENE® IV 20mg/2ml** (Clorzébate)*
prédiluée avec le solvant fourni
- 1 poche de NaCl 0,9% de 100mL **sur 20min** contenant **1 ampoule de NEFOPAM IV 20mg/2mL**
- 1 poche **sur 15min** de **PARACETAMOL 1000mg/100mL**

* Si non disponible : 1 ampoule VALIUM® 10mg/2mL (Diazépam)

!!\ aux CONTRE-INDICATIONS et allergies

Nefopam : en cas d'antécédent d'épilepsie ou de convulsions

Doliprane : en cas d'insuffisance hépatique ou si pris dans les 6h précédentes

Profenid : en cas de grossesse, atcd hémorragie digestive
+ regarder traitements concomitants +++

Tranxène : en cas d'apnée du sommeil, insuffisance respiratoire sévère

Ce document est un guide à la prescription et ne serait se substituer à une évaluation individuelle du bénéfice risque

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter l'équipe douleur au 15345 ou par mail : centre.douleur.ch@aphp.fr